




## Zomerveldboon met de hoogste opbrengstpotentie


LG Cartouche geeft het teeltsaldo van veldbonen een flinke impuls met zijn zeer hoge eiwit-opbrengst. Door een hoge korrelopbrengst én zeer hoog eiwitgehalte van 29 tot zelfs 33% maakt dit ras de teelt van hoogwaardig krachtvoer voor rundvee en kippen aantrekkelijk.

### PROFIEL

- ✓ veel gezaaid kwaliteitsras in Zuid- en Oost-Nederland
- ✓ optimale voerbenutting door hoge plantverteerbaarheid
- ✓ indrukwekkend massaal gewas
- ✓ stevig, stabiel en zeer oogstzeker



Bron: Louis Bolk Instituut & PGRO (UK)



gem. Ned omstandigheden

LG Cartouche

Resultaat in gram/kg, enzj anders vermeld.	Resultaat product droge stof	Streef-traject	Gemiddelde	Resultaat droge stof	Streef-traject	Gemiddelde
DS	805		323	Ruw as	39	90
pH	6,3		4,8	VCOS (%OS)	86,6	64,5
Azijnzuur	5			NH <sub>3</sub> -fractie (%RE)	0	8
Melkzuur	< 1			Nitraat	< 0,2	0,4
VEM	875	1088	721	Ruw eiwit	323	166
VEVI	934	1161	696	Ruw eiwit totaal	324	181
DVE	88	110	48	Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	37	
OEB	95	118	53	Ruw vet	10	24
VOS	669	832	587	Ruwe celstof	100	282
FOSp	507	630	501	Suiker	30	1
OEB 2 uur	98	122	67	Zetmeel	354	146
FOSp 2 uur	344	428	285	NDF	181	454
Structuurwaarde	0,8		2,4	NDFvert.br.hd(%NDF)	26,5	
Verzadigingswd.	0,90		0,89	ADL	10	

/oedenwaarde en analyse-resultaat



# Teeltbeschrijving

## Plaats in bouwplan

De veldboon is een mooi rustgewas, dat diep wortelt en stikstof uit de lucht bindt en weer nalevert. Het volggewas profiteert van een mooie bodemstructuur en stikstofnalevering. Veldbonen zijn waardplant voor stengelaaftjes en sclerotinia. Teel veldbonen minimaal 1 op 5 en houd rekening met vermeerdering van deze problemen indien deze op het perceel spelen.

## Inzaai

- Optimale zaaitijdstip is vanaf half februari tot half april
- Zaaidiepte 5-7 cm in een fijn egaal zaai-bed
- Zaaizaadhoeveelheid is 13 eenheden per ha
- Zorg voor voldoende hoge pH 5 of hoger
- Zorg dat bodemstructuur en ontwatering in orde zijn

## Bemesting

Bemesting met P en K afstemmen op bodemvoorraad, veldbonen is een K minnend gewas. Startgift van max 30 kg N overwegen bij vroege inzaai of bij niet optimale omstandigheden.

## Ziekte en plaagbeheersing

Volg het gewas goed op en overleg bij het aantreffen van deze ziekten en plagen met uw teeltadviseur, zodat u tijdig kunt ingrijpen:



## Onkruid

Voor veldbonen zijn gewasbeschermingsmiddelen toegelaten onder de volgende categorieën van DTG-lijst versie 2.2. van CTGB:

- Akkerbouwgewassen -> 1.5.2. droog te oogsten bonen, in deze categorie kan tuinboon worden gelezen als veldboon
- Groenbemesters -> 1.9.1. vlinderbloemige groenbemesters
- Voedergewassen -> 1.10.1. vlinderbloemige voedergewassen